



# Deltasect PR 1,2 ULV

## SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Nettó tartalom:  
20,0 liter

UFI: UPAQ-QA2H-W003-YOHN



**Sharda Hungary**

**Gyártja:** Sharda Cropchem Ltd. (Mumbai, India) és  
Corax - Bioner Biotechnológiai Zrt.,  
2040 Budaörs, Gyár utca 2.

**Engedélytulajdonos és forgalmazó:** Sharda Hungary Kft.,  
1147 Budapest, Öv utca 182/B.



819041501098066

Engedély száma: NNGYK/30783/2025

Terméktípus:

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint  
más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek

**A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes,  
fénytől védett, jól szellőző helyen, élelmiszertől, takarmánytól, gyermekektől és  
háziállatoktól távol tartandó. A gyártástól számítva 2 évig használható fel.  
(Az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni a gyártási tétel számát  
vagy jelzését és a lejárati idejét szokásos tárolási körülmények mellett.)

Gyártási idő: lásd a csomagoláson - év/hónap/nap  
Gyártási szám: lásd a csomagoláson

**Hatóanyaga:** 0,135 m/m % deltametrin + 0,013 m/m % pralletrin  
**Felhasználhatóság kártevők szerint:** *Aedes spp.*, *Culex spp.*, *Culicoides sp.* csipőszúnyogok kifejlett egyedei  
**Az alkalmazás módja:** Kézi, vagy földi melegköd-képzéssel és kézi-, vagy földi ULV-eljárással kijuttatható irtószert.

**Alkalmazási arány és gyakoriság:**  
**Alkalmazási dózis:** A terület fedettségének függvényében: 0,6-0,8 liter/hektár. Az alacsonyabb dózis a nyíltabb területeken, a magasabb dózis növényzettel részben fedett, sűrűbben beépített területeken javasolt.  
Két kezelés között legalább 1 hétnek kell eltelnie. A kezelést adott területen maximum 5 alkalommal lehet elvégezni, majd 4 hét szünetet kell tartani.

**Felhasználói kör:** szakképzett foglalkozászerű felhasználók részére

**Használati utasítás: Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást.**

**Földi úton, ULV-eljárással történő kijuttatás:**

Alkalmazása különösen a nyílt vagy növényzettel részben fedett területeken javasolt. A kezelés megkezdése előtt el kell végezni a szóróberendezés kalibrálását, a fűvoka- és nyomásbeállítását, annak érdekében, hogy a képződő cseppek legalább 90%-a a 15-40 µm közötti tartományba essen.

A higitatlan készítményt töltsük be az ULV-berendezés tartályába, majd végezzünk próbafúvást, a helyszínen uralkodó légáramlás irányának és erősségének megállapítása céljából.

**Alkalmazási dózis:**

A terület fedettségének függvényében: 0,6-0,8 liter/hektár. Az alacsonyabb dózis a nyíltabb területeken, a magasabb dózis a növényzettel részben fedett, sűrűbben beépített területeken javasolt.

**A kijuttatás eszköze:**

A készítmény kizárólag olyan ULV géppel juttatható ki, amelyet a gép gyártója szabadban történő szúnyogirtás céljára ajánl. Csak szúnyogirtásra felkészített, megfelelő műszaki állapotú, rendszeresen karbantartott ULV berendezéssel hajtsunk végre kezelést! Részletes útmutatóban az európai szabványoknak megfelelő, gyári adattáblával ellátott gépeket.

**Földi úton, melegköd-képzéssel történő kijuttatás:**

Alkalmazása különösen növényzettel sűrűn fedett területeken javasolt. A higitatlan készítményt töltsük be a berendezés tartályába, majd végezzünk próbafúvást, a helyszínen uralkodó légáramlás irányának és erősségének megállapítása céljából.

**Alkalmazási dózis:**

A terület fedettségének függvényében: 0,6-0,8 liter/hektár. Az alacsonyabb dózis a nyíltabb területeken, a magasabb dózis a növényzettel részben fedett, sűrűbben beépített területeken javasolt.

**A kijuttatás eszköze:**

A készítmény olajos bázisú, ezért a munka megkezdése előtt győződjünk meg róla, hogy a melegköd-képző generátor az ilyen típusú szerek kijuttatására alkalmas. A készítmény kizárólag olyan melegköd-képző generátorral juttatható ki, amelyet a gép gyártója szabadban történő szúnyogirtás céljára ajánl. Részletes útmutatóban az európai szabványoknak megfelelő, gyári adattáblával ellátott gépeket. Csak szúnyogirtásra felkészített, megfelelő műszaki állapotú, rendszeresen karbantartott melegköd-képző gépeket hajtsunk végre kezelést!

**A Deltaset PR 1,2 ULV szúnyogirtó folyadék az alábbi szempontok betartásával alkalmazható:**

10 hektárnál nagyobb, összefüggő területek kezelése – járványügyi veszélyhelyt, illetőleg árvíz következtében kialakult szúnyogcspás kivételével – csak IPM (integrált kártevőmentesítési) program keretében történhet, amelynek ki kell térnie a kezelésék gyakoriságára, valamint a rezisztencia-ellenőrzésre is. Minden esetben mérlegeljük a szúnyogtenyésző helyek biológiai módszerrel történő kezelésének lehetőségét!

A kezelés indokoltságának megállapítására a szúnyogsűrűséget, az irtást megelőzően, a „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” c. kiadvány 7.4. fejezete szerint, vagy arra alkalmas objektív mérőmódszerrel fel kell mérni.

A melegköd-képzést és ULV eljárást csapadékmentes, szélcsendes időben, alkonyattól kora hajnalig végezzük el az előzetesen kijelölt területen, figyelembe véve az ártalmat okozó szúnyogfaj(ok) napi aktivitásának csúcsát. A kezelés esőben, vagy 2 m/sec értéknél nagyobb oldalszél esetén, vagy 15 °C légköhmérséklet alatt nem végezhető el! Amennyiben az érintett területen méhesek találhatók, a szúnyogirtás legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg, és legkésőbb a csillagászati napkeltét megelőző egy óráig tarthat.

A kijuttatást végző gépjármű sebessége 15-20 km/óra legyen.

Géptípustól függően, az óránként kezelhető terület nagyság ULV-eljárással max. 20-100 ha, melegköd-képzéssel max. 100 ha.

Törekedjünk arra, hogy a fák, bokrok közé kijuttatott kód legalább 10-15 percen keresztül megüljön, és így elengedő ideig érintkezzen az ott tartózkodó szúnyogokkal.

Ideális körülmények között a képződő kód a kezelés vonala mentén mindkét irányban kb. 25 méter szélességben kiterjed, így mintegy 50 méter széles kezelési sávval számolhatunk, a tényleges terület azonban a kezelés körülményeitől nagy mértékben függ. Összefüggő, nagyobb terület kezelésekor célszerű ellenőrizni (a fogsávból visszaosztani) az 1 hektárra ténylegesen kijuttató mennyiséget és azt, szükség esetén, sűrűbben kijelölt kezelési útvonalal korrigálni. Különösen a kisebb, 50-70 liter/óra névelges teljesítményű gépek használatakor indokolt az ellenőrzés.

Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázostószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint, a méhek védelme érdekében, a szabadban, 1 ha-nál nagyobb területen történő rovarirtást legkésőbb a kezelés megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig, a kezelendő terület helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének írásban, a jogszabályban meghatározott adattartalommal be kell jelenteni.

Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázostószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 16. §-ának (9) bekezdése szerint a földi járműről végzett szúnyogirtást a kezelést megelőző munkanap 9 óráig a kezelés helye szerint illetékes járási hivatalnak, a jogszabályban meghatározott adattartalommal be kell jelenteni.

A termék az állóvizek és vízfolyások partjától számítva 50 méteres biztonságos távolság (25 méter védőtávolság + ideális esetben 25 méter oldalirányú ködterjedés) betartásával juttatható ki. Ennek értelmében a kezelést végző gépjármű legfeljebb 50 méterre közeledhet meg a vízpartot (vagyis a szárazföld és a vízükör érintkezési vonalat).

**Kockázatsökkentő intézkedések:**

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!

Az irtószert kijuttatásakor viseljen védőfelszerelést! A készítmény használata után meg, szappanos vízzel alaposan kezelt kell mosni! Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni, lenyelés esetén a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

A kezelést megelőzően az érintett terület lakosságát értesíteni kell. A lakosság értesítése a kezelést elrendelő, illetve a kezelt terület alapján illetékes települési önkormányzat feladata. Az irtószert kijuttatásáért felelős személy köteles tájékoztatni az illetékes települési önkormányzatot annak értesítési kötelezettségéről. Az értesítés történhet például nyomtatott, sugározott vagy online kommunikáció útján, de törekedni kell arra, hogy a lakosság minél sebezhetőbb körét elérje. Az értesítés tartalmazza az alábbi információkat:

- a kezelés pontos időpontját,
- a kezelésben érintett település, településrész megjelölését,
- az irtószert és a kijuttatástechnológia nevét,
- a lakosság részére javasolt intézkedéseket, az alábbiak szerint: "A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feloldozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt virágzó edényekben, a különböző tárgyakban megülő eszövízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlanulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket."

Az irtószert kijuttatásáért felelős személy a kezelés megkezdése előtt köteles beszerezni az illetékes önkormányzat azon nyilatkozatát, miszerint a lakosság tájékoztatása a fent leírt módon megtörtént.

**Figyelmeztetés: Veszély**

**H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**P101** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

**P261** Kerülje a gőzök, permet belegézését.

**P280** Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P301 + P310 + P331** LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.

**P405** Elzárva tárolandó.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladék-lerakóba szállítás szükséges.

**Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések:**

Általános elsősegélynyújtási intézkedések:

Méregnyelvét elszívó személyt TILOS magára hagyni.

Amennyiben orvosi ellátás szükséges, a termék címkéje vagy csomagolása legyen kéznél, és forduljon toxikológiai központhoz.

Bármel való érintkezés azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot és az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossuk le, dörzsölés nélkül.

Szembe juttás esetén: óvatosan öblítse ki a szemet bő vízzel. Amennyiben kontaktust észlel, távolítsa el azokat, ha ez könnyen megvalósítható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: A száját ki kell öblíteni. Itasson sok vizet. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.

Belegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetre kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy nem szűnnek, hívjunk orvost.

**Környezetvédelmi óvintézkedések:**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolását élővízbe, talajba, illetve a közcsatornába juttatni.

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószert szennyezett egyéb hulladékok veszélyeshulladékként kell ártalmatlanítani, a kezeléskör) a felhasználó a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

**5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószert szennyezett egyéb hulladékok veszélyeshulladékként kell ártalmatlanítani, a kezeléskör) a felhasználó a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

**Mérgezésérték, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat**

**díjmentesen, 24 órán keresztül hívható**

**zöld száma: 06 80 201 199.**

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

