



NEVIKÉN®

Extra

ROVAR- ÉS GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER EMULZIÓKÉPZŐ KONCENTRÁTUM (EC)

Hatóanyag tartalom: paraffinolaj 58 % (m/m)
polisulfidkén $7 \pm 0,5\%$ (m/m)

Forgalmazási kategória: III

Gyártási idő, szám:
Nettó tartalom:
Engedély száma:

lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)
5 liter
21294/1996 FVM

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást
és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait



Engedély tulajdonosa, gyártja, kizsereli és forgalomba hozza:

CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

www.corax-bioner.hu

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások		Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége (l/ha)	víz
Kultúra	Károsító		
almatermésűk (alma, körte, birs, napoly), csonthegyzók (cseresznye, meggy, kajabacsk, fűzöbácsk, zihla), szőlő (fűz és társzaki lemosó permetezésre)	lichturmat, pajzstetű, levéltetűtűjsók, körte-leveletbóka, kártető atkák gyérítésére	25 - 50	1000 - 1200
szőlő	lichturmat vegetációban	0,5 - 1,0 %	600 - 1200
káliszók (árpá, búza, rozs, zab, tritikáé)	lichturmat	1,0 - 2,0 %	250 - 300
alma	takacsatkák gyérítése vegetációban	0,5 - 1 %	600 - 800
fekete és piros ribiszke, málna, köszméte, fekete bodza, josta	takacsatka, levéltetű, pajzstetű áttelők áttelelése ellen nyugalmi állapotban	2,0 - 3,0 %	600 - 900
szamóca	atkák, levéltetű, pajzstetű ellen vegetációban atkák, levéltetűk ellen vegetációban	0,5 - 1,0 % 0,5 - 1,0 %	600 - 900 400 - 500
szeder	szederatka áttelelése ellen vegetációban	2,0 - 3,0 % 0,5 - 1,0 %	600 - 900 600 - 900

Házi kerti felhasználás:

- 0,5 - 1,0 dl / 6 - 12 liter víz/100 m² (szőlő, almatermésű, csonthegyz - vegetációban)
- 2,0 - 3,0 dl / 6 - 9 liter víz/100 m² (ribiszke, málna, köszméte, szeder, fekete bodza, josta - áttelők alakok ellen)
- 0,5 - 1,0 dl / 10 liter víz + 4 - 5 liter/100 m² (szamóca - vegetációban)

Előírt növényvédelmi technológia:

Almában, szilvában, körteben rugyafutásidő a szőlőbombsz állagot 25-50 l/ha **őszibarackban, kajszibarackban, cseresznyében, meggyben** rugyafutásidő 25-50 l/ha, rugyafutásidő szőlőbombsz állagot 25-30 l/ha mennyiségben **szőlőben** rugyafutásidő 25-50 l/ha, rugyafutásidő gyapottal állagot 25-30 l/ha mennyiségben kell felhasználni. **Szőlőben** vegetációban a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenéséig kell kijuttatni, és a fertőzés veszélytől függően 7-12 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 5 alkalommal) célszerű megismételni. Melegebb/északibb időjárásnál az alacsonyabb dózis használata ajánlott. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetelési forduló és a magasabb koncentráció alkalmazása ajánlott. A permetelési megismétlést a lombzot nagyságától függően kell megválasztani, mert minden esetben törekedni kell az egyteljes- és teljes permetelésre; még a lombzot belsejében is. **Káliszókban** lichturmat a fertőzés veszélytől függően, 1-3 alkalommal, szárbándulástól virágzásig cserzői védekezni, 10-20 naponta. **Almában** a készítményt a felparazitosodó takacsatkák gyérítésére a tavaszi időszakban 7-10 naponta, 2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. A készítménynek almafa-lichturmat ellen kedvező mellékhatása van. **Ribiszke, málna, köszméte, szeder, fekete bodza, josta** kultúrákban takacsatkák, levéltetűk, pajzstetűk, szederatka áttelők alakjai ellen a védekezést ócska lombhullás előtt, tavasszal rugyafutásidő kezdeté kell elvégezni nagy permetelési-mennyiséggel lemosószeregen (ribiszke, málna, köszméte, josta 600-800 l/ha; szeder, fekete bodza: 800-900 l/ha) l. Vegetációban, állománykezelésben, takacsatkák, levéltetűk, pajzstetűk károsító alakjainak gyérítésére, 7-10 naponta 2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. Az alkalmazandó koncentrációt az áttelők alakok egyedyszámától, illetve vegetációban a fertőzés erősségétől függően célszerű kiválasztani. **Szederben** szederatka gyérítése céljából rugyafutásidőkor 3,0%-os, bimbós állapotban és virágzás kezdetén 1,0%-os koncentrációban javasson kijuttatni. A védekezőket rugyafutásidő az áttelők nöstények és az általuk lerakott tojások ellen, illetve a kártető mirigyszálak időszakban, bimbós állapotban és a virágzás kezdetén kell elvégezni addig amíg a mirigő egyedek a vácokkáljon meg nem telepednek. **Szamócaban** atkák, levéltetűk ellen tenyészidőszakban szükség szerinti ismétléssel teljes borítást biztosítópermétnológiájú kijuttatva. A készítmény beleszórható a bogysó gyümölcsök kultúrák környezetkímélő integrált növényvédelmi-menedzselésébe.

A készítmény fagymentes időszakban kell kijuttatni. A szer hatását rontja a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozók fejlődése és a károsítók mozgása még nem indult meg, valamint a kezelés utáni túl nagy mennyiségű csapadék, amely a szer lemoshatja. A permetezés elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órákban szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékletű viszonyoknál. 25°C feletti alkalmazása perzselési veszélyt jár.

A bekevert permetelvet az elkészítés napján fel kell használni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Gyártói ajánlás:

Lúgos kémhatása és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekekkel nem keverhető. Réztartalmú növényvédő Lúgos kémhatása és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekekkel nem keverhető. Réztartalmú növényvédő szerekek előzetes keverési próbát elvégzése javasolt. A készítmény érs és alumíniumtartalmú eszközökkel károsíthatja. Bőrgyógy, súlyos nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. A felbontható gőnyölgyleg tartalmát lehetőleg maradtartalmán fel kell használni. Kombinációs partner tartályba való bekeverését megelőzően, a változó körülmények miatt minden esetben célszerű előzetes keverési próbát elvégezni. Olajosíték tartalmú termékekkel nem keverhetőek magas nitrogén tartalmú műtrágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal továbbá nedvesítőszerek adalék hozzáadásása sem javasolt.

Felhasználás előtt felrészandó!

A készítmény eltarthatósága:

• eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos fagymentes növényvédő szer rakártaon 2 év.

Előkészítőknék és felhasználóknak:

A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírása:

Víz szervezetekre való veszélyessége: nem jelöléskötele

Méhveszélyesség: nem jelöléskötele

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelöléskötele

A készítmény p.o.LD₅₀ értéke (patkányon): >3869 mg/tkg

Figyelmeztetés: **Veszély**

H304 Lenyelve és légtudba kerülve halálos lehet.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védekesztű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vizel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megmozdítható.

Az öblítés folytatása.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon a TOXIKOLÓGIAI

KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P301 + P310

P331 TILOS hánytatni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékmentes:

veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével

ne szennyezze a vizeket!

(A berendezés vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!

Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való

szennyezést!)

A víz szennyezett védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban

tartható meg egy kezeltelen, növényzettel borított (lehetőleg zárt

gyp) biztonsági övezetet!

SPe 3

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Munkaeségügyi várakozási idő: 0 nap;

Ételmezés - eségügyi várakozási idő: Az engedélyezett kultúrákban előírás

szertini felhasználás esetén korlátozás nincs;

Munkaeségügyi övrendszámból: egyéni védőfelszerelés – előkészítőknék és

kijuttatóknak védőruhára, védőkesztű, sav elleni védőruka, védőlábél.

Elősegélynyújtás, terápia: Mérgezősok, allergiás megbetegedés esetén, vagy

annak gyanújának a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás

után (lásd: lég- és ásványolaj mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Tüneti –

megfolygó kezelést!

Ellenanyag: specifikus antitóduma nincs.

Mérgezősok, vagy annak gyanújának az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató

Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

A kiürlést és tisztított csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos!

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek

listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen Tel.: +36 1 340 4888

UFI: CF00-106G-S00Q-57Y6

